

Ritalin & Zolofit ”otillräcklig effekt”

”Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt”

Concerta och Ritalina. ”kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar och skakningar. Tid. provat Strattera utan effekt.”

”Patient har beh med Metylfendat (!) i ökade doser, utan signifikant klinisk effekt i lägre doser och svåra biverkningar såsom ökad agitation, sömnstörning, muskelvärk och tachycardi i högre doser än 30 mg.”

”Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvärigheter.”

”Provat Ritalin, Concerta o Strattera utan framgång.”

”Tidigare beh-försök således med Concerta och Ritalin i flera år visat sig otillräcklig effekt.”

”Prövat metylfenidat men pg av otillräcklig effekt och biverkan nu stått på Metamina drygt ½ år”

”Concerta har prövats i upptrappande dos till 54mg/d med viss effekt men tilltagande ångest. Byte till Strattera som redan vid låg dos gav kraftigt illamående, yrsel och aptitlöshet.”

”prövat både Concerta och Strattera men avbrutit båda behandlingarna pga biverkningar trots god effekt på ADHD-symtomen. ” Concerta dysfori och ångest. Strattera sexuella problem.

Concerta. ”flerårig anamnes med depressionssjukdom...Concerta, som dock gett biverkningar i form av oro, ångest och sömnsvärigheter, stresskänsla. Fått dessa biverkningar även vid låg dosering”

Ritalin, Equasym, Strattera. ”Viss men ej tillräcklig effekt.”...bieffekter av både Strattera och CS.”

”Effekten av Ritalin har varit begränsad och patienten har dessutom blivit mer nerstämd.”

Concerta...”besvärande rethosta som är klart relaterad till denna medicinering”.

”Man har provat med olika centralstimulantia såsom Concerta och annat. Resultatet var väldigt torftigt.”

Strattera och Ritalin. (Ritalin) ”får han pulshöjning som är besvärande och han får också en ökad ticsproblematik vilket också är besvärande”...Pulshöjningen har legat kring 100 slag/min i stället för normal vilopuls kring 70 vid både sköterskekontroller och läkarkontroller.”

”De alltjämt påfrestande yttre omständigheterna medför svårigheter att göra en rättvisande utvärdering av behandlingen.”...ansöker om licens för fortsatt behandling med Metamina, då fördelarna jämfört med de tidigare behandlingsförsöken med metylfenidat är uppenbara.” Samtidig behandling med Sertralin, Stilnoct.

”prövat Ritalin som gjorde henne nedstämd”.

Metylfenidat. ”fick av det besvärande biverkningar”.

Concerta, Ritalin. ”allergiska biverkningar i form av andnöd”.

Behandling för depression ”ej förbättrats av omfattande behandling...metylfenidat i försiktigt ökad dos men reagerat med illamående, yrsel, stresskänsla, som lätt stegras till svår ångest, vilket gjort dosökning över 45mg Concerta omöjlig.”...försök med tillägg av Strattera har även gjorts utan positiv effekt.”

Metylfenidat. ”Efter utredning har patienten behandlats med metylfenidat, dos ca 60mg m positiv verkan. Patienten tycker att effekten är otillräcklig och vill därför pröva Metamina i stället.”

Concerta, Ritalin. ”avbröts alltså pga en misstänkt allergisk reaktion.”

Ritalin, Strattera. ”Ritalin...uppkom reaktion (utslag, klåda) Strattera ej framgångsrikt:sömnproblem, känslomässig avtrubning”

”inte tidigare tålt Concerta.”

”Maximala dosen på Concerta har varit 72 mg och maximala dosen på Ritalin har varit 40mg 2 på morgonen...I högre doser har han snarare blivit överstimulerad utan att man nått symtomlindring fullt ut”.

”Ritalina och Concerta som fått avbrytas pga biverkningar.”

Metylfenidat. ”successivt ökande dos [Metamina] till 12 tabl/d”

”Insätts på Ritalin... fick sluta medicinera pga alltmer uttalade tics. Man provar Strattera, fungerar inte heller på denna medicin pga illamående och även nu ökade tics...För närvarande medicinfri, men tendenser till stämningssvängningar, kraftiga tics och svårt med koncentrationen”...prova med Metamina”.

”Allteftersom vi lär känna patienten bättre märker vi att effekten av Concerta 2 tabl. 36 mg dagligen är otillräcklig...Vi har fått öka dosen Concerta, varit uppe i 126mg dagligen och hon har också fått tillägg av Ritalin i tablettform men fortsätter att uppleva f f alt enorm trötthet och svårigheter att komma igång. Vid det här laget undrar ut (undertecknad) om Metamina kan vara ett alternativ...Pga otillräcklig effekt av metylfenidat önskar få testa Metamina för att optimera (!!) behandlingen då pat upplever hopplöshet avseende förbättringen av sitt tillstånd.”

”Pat har nu provat tabl Metamina 5 mg i tre månader. Blev akut sjuk i tre månader. Blev akut sjuk vid läkarbesök inflr förnyad licensprövning men kunde idag komma på läkarbesök.”

Concerta, Ritalin, Strattera. ”Patienten har inte varit kapabel att fortsätta med dessa mediciner pga biverkningar av preparaten och ibland för att han inte haft någon nytta av dem...man får ge patienten en chans att prova Metamina också.”

”Strattera, Concerta och Ritalin inte givit effekt...prövat Ergenyl för att dämpa ilskeutbrott utan effekt...fick därefter Lithionit mot samma problematik”.

”...behandlingsförsök med metylfenidat upp till 90mg dagligen, en relativt hög dos med tanke på att pat väger ca 60 kg. Medicineringen hade dock ingen påtaglig effekt, varför försöket avbröts efter några månader...inre stress och påtagliga svårigheter att komma igång med uppgifter och slutföra påbörjade projekt omöjliggör såväl arbete som ...sociala kontakter...göra behandlingsförsök med Metamina.”

Samtidig: Mirtazapin, Imovan, Circadin, Oxascand. ”men effekten av 5mg 2+2+1 [25mg], är otillräcklig, så dosen planeras höjas.”

Concerta och Strattera. ”fått lov att avslutas pga nedstämdhet, sömnlöshet och en känsla av att inte känna igen sig själv.”

Metylfenidat. ”svårt att utvärdera behandlingen...Det han framförallt tycker sig ha uppnått är dock en förbättrad förmåga att hantera kontakten med ’besvärliga människor’. Pat har upplevt en påtaglig trötthet som eventuellt kan avspegla att han har en mer avspänd situation.”...Biverkningar förekommer i form av huvudvärk, åksjukeliknande illamående, som dock vid behandlingen med metylfenidat var mer uttalade, samt då och då diarré. Vidare har patienten ticsliknande blinkningar i ungefär samma omfattning.”

Concerta och Ritalin. ”undertecknad vore tacksam om denna byråkrati [licensansökningen] handläggs omedelbart...Överläkare, specialist i psykiatri”

Ritalin. ”hans motoriska tics försämrades och han fick även biverkningar i form av dubbelseende...”

Metylfenidat. ”provat alla centralstimulerande preparat på marknaden i Sverige, men utan önskad effekt och med biverkan svår huvudvärk.”

”Endast ringa effekt av Ritalin”

Metylfenidat och antidepressiva. ”i adekvat dos har haft otillräcklig effekt.”

Metylfenidat. ”fick av detta intolerabla biverkningar.”

Concerta ”inte märkbart positivt resultat”

Concerta och Ritalin. ”av båda preparaten intolerabla biverkningar i form av ångest, illamående, ökad värk och trötthet.” med Metamina ”förbättring vad gäller uthållighet”

Metylfenidat ”utan att uppleva en tillfredsställande effekt”

Concerta ”effekt..klingade av...i samband med depression”

Concerta och Ritalin. ”Fått biverkningar”

Metylfenidat ”utan tillräckligt bra effekt”

Concerta, Ritalin. ”fick avsluta denna efter ett par månader pga svåra biverkningar i form av muskel- och ledvärk, inbundenhet och självmordstankar...fick pröva Ritalin...samma biverkningar men i mindre omfattning”

Concerta ”utan någon nämnvärd effekt”

Ritalin ”utsatt pga biverkningar”

Concerta ”som i stort sett saknade verkan”

Concerta, Ritalin ”besvärats av muskelära biverkningar som han tydligt sätter i samband med medicinering”

Ritalin ”med biverkningar...ökad muskulär tonus, magsmärtor”

Aktuell Ritalin 40 mg på morgonen, T Metamina 0+3+3
”nödvändig för att få dagen att fungera”

Metylfenidat ”gav...dermatit”

Metylfenidat ”blev hyperfokuserad på något sätt”

Ritalin ”hjärtklappning och muskelvärk”

Ritalin, Stratterra. (Ritalin) ”effekt helt avklingat. Ger ytterligare sänkning av sinnesstämmningen.”

Metylfenidat ”effekten mycket ojämn” ”vid 3,5-4 tabletter mkt god effekt, men samtidigt grandios känsla.”

Metylfenidat ”utan gynnsam effekt”

Metylfenidat ”ej gett adekvat effekt, utan biverkan i form av feber, dimsyn”

”prövat likvärdiga produkter till Metamina men ej haft tillräckligt god effekt”

Ritalin ”otillräcklig behandlingseffekt gav mer biverkningar, palpationer, trötthet, klart sämre koncentrationsförmåga med Ritalin.”

”Strattera har inte fungerat. Concerta, Ritalin..fungerar...men får samtidigt biverkningar i form av framförallt ångest varför ha har svårt att ta medicinen i den dos han skulle behöva.”

”Har en ständig förfrågan om högre doser även om han accepterar den nuvarande doseringen, som åtminstone en längre tid satts som maxdos...Huvuddiagnos är fortsatt ADHD (F900) samt Beroendesyndrom (F 192).”

”frånvarande effekt av både Ritalin och Concerta (dos upp till 100mg vid tidigare behandling)

”behandling med Metamina avslutats pga uppenbara svårigheter med compliance...även begått brott...vårdas inneligande på obestämd tid...önskar man nu, under mer kontrollerade former återuppta behandling med Metamina.”

”Concerta däremot gav en hel del biverkningar.”

”Concerta och Ritalin utan effekt.”

”emotionell instabil personlighetsstörning, recidiverande depression och ADHD...provad Concerta, Ritalin och även Strattera utan framsteg. Fick framförallt biverkningar.”

”metylfenidat...utvecklat relativt besvärliga biverkningar i form av främst magbesvär, illamående och kräkningar.”

”prövat medicinera med registrerade preparat utan större effekt.”

”Concerta/Ritalin givit mängder av okaraktäristiska biverkningar.”

”åt Ritalin som inte fungerade och har haft biverkningar.”

”Metylfenidat tidigare provat med avsevärt sämre effekt.”

”metylfenidat...effekten varit otillräcklig. Biverkningar, irritabilitet, oro, nedsatt verbalt flöde.”

”metylfenidat...många biverkningar i form av gastrointestinala besvär, olustkänsla, likgiltighet, muskelkramper och slemhinnesvullnad. I anamnesen mångårigt missbruk av amfetamin, i små doser.” Dos: 100 mg/dag

”...72mg Concerta utan påtaglig effekt och med en ökad ångest, även panikattacker...Med tanke på patientens mycket höga ambitionsnivå och återkommande upplevelser av misslyckanden och oavslutade projekt, bedöms det vara av stort värde för henne att få göra ett behandlingsförsök med Metamina.”

”Concerta och Ritalin har fått stoppas pga biverkningar i form av bla depressivitet och tilltagande ångest samt otillfredsställande effekt.

”Concerta ... yrsel och lågt blodtryck.”

”tidigare med Concerta, Ritalin och Strattera utan effekt.”

”avsevärt mer biverkningar av metyلفenidat och mycket sämre effekt.” Dos: 50mg

”Ritalin...förhöjd puls som var oacceptabelt hög.”

”under en kort period självmedicinerat med små doser amfetamin och på det mådde hon bättre.” Dos 75mg/dag

”Ritalin och Concerta...ofördragbara biverkningar...hastiga känslösvängningar från rusartad lycka till sorg och gråt. Strattera prövades vilket gav stark oro och ångest.”

”Concerta och sen Ritalin...antydde positiv effekt i form av minskning av oron. Vid höjning av dosen...huvudvärk, ökad svettning, magbesvär samt viss ökning av oron.”

”Concerta...kraftig biverkan i form av illamående och tilltagande magbesvär. Bytte sedan till Ritalin upp till dos 140mg dagligen. Har dock kvar mycket av koncentrationssvårigheter, trots denna dos ...vill därför pröva Metaminabehandling...utredning...konstaterades också recidiverande depression, emotionell instabil personlighetsstörning...också ett blandmissbruk.”

”prövat Ritalin och Concerta men hade inte någon bra effekt, däremot en hel del besvärliga biverkningar, med huvudvärk, ökad ångest och minnesstörningar.”

”Concerta...dålig effekt och huvudvärk.”

”Ritalin...110mg...ej haft fullständig effekt...Upplever vissa kvarstående koncentrationssvårigheter.”

”metylfenidat...sensitiv, otrygg, antydde paranoidea känslor vid högre dos.”

”provat såväl Ritalin och Concerta och behövt mycket höga doser, dock inte känt sig helt hjälpt och har nu blivit inställd på Metamina i ovanstående dosering...frågan är om hon nu behöver höja dosen.”

”provat såväl Strattera som Ritalin och Concerta utan någon som helst effekt. Däremot...en hel del biverkningar.”

”provat Concerta, Ritalin och Strattera och allt med ganska dåligt resultat.”

”Concerta...biverkan i form av huvudvärk där pat även vid ett par tillfällen fick inta sängläge.”

”provat både Ritalin, Concerta och Strattera...allergisk reaktion både på Concerta och Ritalin. Strattera hade inte någon effekt förutom att öka patientens ångest.”

”Concerta sedan Strattera...utan tydlig effekt dock med besvärliga biverkningar (agitation, irritabilitet, sömnstörning). Därefter insatt på Amfetamin...trots dosjusteringar haft tilltagande besvär i samband med avtändning vid varje dostillfälle, speciellt efter sista dosen (snabba kraftiga humörsvängningar, tilltagande psykis trötthet, sämre koncentrationsförmåga...I och med att dexamfetamin har något längre halveringstid och bättre halveringstid än amfetamin kan avtändningsperioden tolereras bättre bedömer ut. Att pat borde få möjlighet att testa dexamfetamin.”

”Ritalin...avbröts efter ca en vecka pga ökad aggressivitet...Försök har även gjorts med Concerta men även då ökade aggressiviteten på liknande sätt som med Ritalin.”

”prövat alla på marknaden tillgängliga läkemedel mot sina funktionsnedsättningar...Ritalintabletter, därefter Concerta...prövat långverkande Ritalin, liksom Equasym Depot, med biverkningar i form av aptitnedsättning och sömnsvårigheter. Även känt sig orolig och nedstämd...prövat Strattera...högst måttlig effekt...prövat

kombinera Strattera 60mg (kvällstid) med 36mg Concerta på morgonen...finns erfarenheter bland praktiserande kollegor (i både barn och vuxenpsykiatri) att Metamina kan fungera något bättre i denna patientgrupp.”

”sedan många år i underhållsbehandling för opiatberoende...medicinerar för närvarande med Metadon...också diagnosen ADHD...medicinerat med Strattera...Mådde inte bra av detta och har blivit insatt på Concerta... fungerar bra under dagtiden men gör honom orolig på sen eftermiddagen...har själv provat såväl amfetamin som Metamina och beskriver att effekten av detta har fördelen att den försvinner under eftermiddagen och gör att han sover bra på nätterna...behandlingsförsök med metamina.” Dos: ”upptrappande till lämplig nivå”

”Concerta upptrappande utan påtaglig effekt, sedan Ritalin upptrappande till 50mgx4!, med viss effekt, men ej optimal...Även försök med Strattera som patienten ej tolererat och ej heller kunnat invänta effekt pga tidigare irritabilitet återkommit. Önskar nu försöka med Metamina, då jag inte kunnat få full effekt av Metylfenidat, trots extrema doser.”

”behandlats med kortverkande Ritalin, med Concerta och med de bägge preparaten i kombination och besväras av en känsla av medicinpåverkan varför han önskar pröva Metamina.”

”Pat har tidigare haft utmattningsdepressioner sannolikt till följd av hennes ADHD-problematik.”

”Både Concerta och Ritalin har orsakat svåra biverkningar i form av illamående, kräkningar, viktnedgång, oro och nedstämdhet.”

”Tidigare ett flerårigt beroende av amfetamin...medicinerat med metylfenidat, tidigare Concerta, nu Ritalin...ej mått bra, är irritabel, depressiv. Har provat tillägg av antidepressiva, Sertalin, Cymbalta, även provat Lamictal utan någon förbättring av måendet.” Dos 60-90mg.

”Concerta med otillräcklig effekt samt fått ökad ångest...Ansöker nu om licens för Metamina för att optimera effekten av CS.”

”under våren har Metaminadosen ökats till 11-13 [55-65mg] tabletter dagligen.”

”Diagnos Uttalat trötthetssyndrom, generaliserat ångestsyndrom...behandlats med Metamina då Ritalina ej givit effekt och medfört biverkningar.”

”prövat Conerta och Strattera men reagerat med kraftiga biverkningar.”

”Medicinering med metylfenidat ...fått avbrytas på en förhållandevis låg nivå pga ångestattacker...även ett försök med Strattera...avbrutits av samma skäl som tidigare.”

”Concerta gav sömnsvärigheter och oro och byte till Strattera gav ökad ångest.”

”prövat Concerta resp Ritalin och förbättrades påtagligt gällande koncentrationen. Fått avbryta båda behandlingarna pga mkt besvärliga biverkningar.”

”nu på Concerta, men kan inte ta mer än 18-36mg/dag, vilket ger otillräcklig effekt. Om hon tar mer får hon hjärklappning och blir illamående.”

”Behandlad m metylfenidat, upp till 70mg/d m pos resultat men klart otillräcklig eff. Varför byte till Metamina rek.”

”Behandlad m metylfenidat...Effekten har varit dålig, enda pos effekten har varit att hon inte varit så irriterad.”

”metylfenidat utan effekt.”

”Beh med metylfenidat i relativ höga doser. 70mg/dag utan adekvat effekt samt biverkningar i form av takycardi och tremor.”

”utretts vid vår specialistklinik för missbrukssjukdomar och han har satts in på Ritalin varpå han utvecklade en psykos vilket medförde vård på vår vårdkrävande avdelning...övergång till Concerta förbättrades..kunde skötas i öppenvården. Han har upplevt en icke fullgod effekt av Concerta varför vi nu ansökt om Metamina...tidigare behandlats med höga doser Ritalin och Concerta (216mg per dag) utan riktig effekt.”

”provat behandling med alla alternativ som står till förfogande: Concerta, Equasym, Ritalin, men effekten har inte funnits och pat har haft väldigt mycket biverkningar.”

”Dosering 8+8+8 DAGLIGEN” ger 120mg/dag.

”prövat Ritalin och Concerta men var inte glad då han åt dessa preparat...Strattera god effekt på ADHD...ont i magen...Det magonda har tilltagit.”

”vill höja dosen till 6+4+2+2.” 70mg/dag.

”provat metylfenidat, som dels inte hjälpt och dels givit biverkningar vid måttlig dosnivå.”

”Diagnos: Långdragen svår depression...bipolär sjukdom med framför allt mycket långdragna och svårbehandlade depressioner...kronisk suicidrisk...Behandlats med en stor mängd psykofarmaka utan nämnvärt positivt resultat. Tidigare ev viss effekt av ECT...ordinerad tvångsmedicinering med ECT. Sedan nov Metylfenidat med svag till ev liten effekt. Till denna svårbehandlade pat tycker jag det är värt att göra ett försök med Metamina då vi hittills inte lyckats hjälpa henne med någon annan medicin.”

”ej haft fullgod effekt av antidepressiva...prövar concerta och ritalin och han kände effekt på koncentration och arbete. Ganska snart får han ångest nedstämdhet och livsleda...Pat kan troligen vara hjälpt av att pröva metamina.”

”Concerta 18mg. Ökad handikappande ångest...Vissa nätter kunde...inte somna alls.”

”ofullständigt svar på Ritalin i hög dos.”

”metylfenidat...ej optimal effekt...besvärades av upprepade ångestattacker...Ej haft stöd i medicinering...återfall i amfetaminbruk...avgiftats...angeläget att han ges möjlighet att pröva Metamin. Metylfenidat har gett biverkan i form av depressivitet med djup håglöshet, bristande framtidstro.” ”Dosering [Metamina] 15-18 tabletter per dag” 75-90mg

”prövat såväl Ritalin, som Concerta...måttlig effekt, biverkan i form av depressivitet, obehagskänsla.” Metamina ”18-20 tabletter dagligen” 90-100mg

”konstant tendens att skjuta fram olika projekt...hög begåvad och sannolikheten är att han med adekvat behandling med centralstimulantia skulle ha större chans att klara av dessa...testat metylfenidat och fått påslag av ångest och oro.”

”Ritalin...svåra biverkningar i form av hjärtklappning, huvudvärk, ökad oro, aptitlöshet och sömnsvårigheter.”

”prövat både Strattera och Ritalin men fått intolerabla biverkningar.”

”provat Ritalin med dålig effekt.”

”Concerta...gav svår ångest...Ritalin...som ej gav någon effekt. När dosen ökades fick pat ångest och förstärkning av aggressiva känslor. Planerar för insättning av dexamfetaminsulfat [Metamina].”

”medicinerat med Concerta med dåligt behandlingsresultat.”

”komplicerad psykiatrisk problematik med både en emotionellt instabil personlighet, tidigare alkohol- och drogmisbruk i kombination med ADHD...Under senaste tiden...haft en del återfall, druckit alkohol och rökt hasch. Trots detta upplever patienten ett minskat drogsug då hon tar centralstimulantia...stor vikt att patienten får fortsätta med Metamina.”

”hereditet för ADHD...behandling med Ritalina. Det visade sig att pat var lätt deprimerad, vilket lett till att pat genomgått behandling med antidepressiva läkemedel. Det visade sig i slutändan att pat inte är särskilt deprimerad och att hennes symtom helt och hållet kan förklaras av grunddiagnosen ADHD...provat utan framgång behandling med T Concerta 36mg/dygn...inte heller tolerera T Strattera.”

”prövat metylfenidat men utvecklat biverkningar med ökad oro, känsla av att vara drogpåverkad och stark klåda.”

”Concerta i dosen upp till 54 mg/dygn...nedstämdhet och känsla av att vara avskärmad...Ritalina...haft återkommande besvär med suddig syn och dubbelseende...ögonläkare...’viss accommodationspåverkan kan vara orsakad av Ritalin”

”provat adekvata doser av Concerta och Ritalin och fått biverkningar i form av ångest när medicineffekten avtagit. Även provat Strattera, men fått stora biverkningar.”

”behandlad med Ritalin i hög dos (160mg/d)...Mkt gott behandlingsresultat men kraftig anorexi...gått ner i vikt fr 64 till 54 kg. Lägre dos har prövats hela tiden med då uteblir den positiva verkan av metylfenidat.”

”Concerta och Ritalin vilka båda gav mycket biverkningar i form av ångest och hjärtklappning.”

”ADHD och drogberoende i remission (blandberoende)...Tidigare har behandlingsförsök gjort med Concerta, Ritalin och Strattera. Patienten har uppvisat häftiga och oväntade

biverkningar vid samtliga behandlingar(alltifrån allergi till hallucinationer). Ett sista försök att behandla patientens rastlöshet planeras med Metamina.”

”Concerta...fick beteendestörningar. Bytte till Ritalin men fick deprimerade tankar, blev mer impulsiv, intoxikerade sig med Ritalin 5 st tabletter...Vid ett annat tillfälle fasadklättrat upp på et högt hus på taket. Hämningarna var helt försvunna och han hade en slags ruskänsla i kroppen...prövade med Stratterabehandling och var uppe i 40 mg då han fick somatiska biverkningar i form av svår trötthet, sömninghet, svår buksmärt, influensakänsla, växlande aktivitetsnivå m.m.”

”provat både T Ritalin och T Concerta utan effekt, samt svåra biverkningar kunde noteras.”

”en rejäl ADHD samt därtill kopplat amfetaminmissbruk...provat såväl Concerta som Ritalin. Concerta fungerade inte alls då han fick psykotiska upplevelser. Ritalin provat även upp i rimliga rejäla doser utan fullgod effekt. Två allvarliga självmordsförsök senaste månaden och jag har svårt att se att vi kan avstå från att prova Metamina också då detta nu nästan känns som sista möjligheten för att rädda livet på honom.”

”mångårigt blandmissbruk med övervägande amfetamin...Concerta och Ritalin i höga doser med viss effekt. I högre doser blivit överstimulerad utan att man nått symtomlindring fullt ut, främst avseende koncentration och rastlöshet.”

”Concerta med någon effekt dock med mycket starka bieffekter.”

”Försök med Concerta har gjorts med efter att ha tarppats upp till 36 mg utan effekt fick pat domningar, yrsel och huvudvärk som föranledde inläggning inom somatiken.”

”Concertabehandling...får besvärande biverkningar av yrsel.”

”medicinerar även med Subutex 12 mg.” ”Dosering 12 tabletter 3 gånger dagligen” (180mg)
”försökt med Ritalina och Concerta men upplevt svåra biverkningar.”

”Concerta...dos 54 mg på morgonen och 18 mg på dagen...inte fått speciellt god effekt på sitt mående och sin koncentrationsförmåga. Vill själv pröva Amfetaminpreparat.”

”metylfenidat har haft måttlig, klart otillräcklig effekt varför behandling m dexamfetamin rek.”

”Concerta långsam dosupptrappning upp till 54 mg. Inititalt upplevde patienten ett gott humör, han blev lugnare, han kunde sitta stilla och mindre impulsgenombrott. Då dosen inte räckte till eftermiddagen gjordes en doshöjning till 54 mg på morgonen och 54 mg på eftermiddagen...fortfarande hade det svårt på eftermiddagen/kvällen höjde vi dosen till 162 mg...fortfarande inte hade någon påtaglig förbättring eller effekt överförde vi honom till kapsel Ritalin 160 mg med successiv dosupptrappning till 160 mg...återföll dock i ett alkoholmissbruk...Förnyad misshandel och berusning...satte man in Medikinet i dos 160 mg med en förbättring på koncentration och rastlöshet men patienten upplevde huvudvärk som försvann när man satte ut medicinen vilket medförde att den kognitiva försämringen kom tillbaka.” Dosering 14 tabletter, 70 mg.

”provat på marknaden tillgängliga samtliga metylfenidat-preparat såsom Medikinet, Ritalin, Concerta och även Atomoxetin – Strattera. Samtliga preparat har gett honom biverkningar och han har inte upplevt någon god effekt av någon av dessa.”

”Concertabehandling med dåligt resultat.”

”Tidigare missbruksanamnes finns...iatrogent bensodiazepinberoende...provat Concerta upp till 36 mg med så svåra biverkningar i form av irritabilitet, sänkning av stämningsläget och trötthet i kombination med sömnstörning att han själv avbröt.”

”Concerta inte haft tillräcklig effekt.”

”provat Concerta och Ritalin (metylfenidat) men har fått utslag och ingen effekt. Är lika rastlös som tidigare.”

”Ritalin, Concerta och Strattera haft otillräcklig effekt och oacceptabla biverkningar.”

”står på medicinering med Concerta 7 x 36 mg + 18 mg som verkar vara otillräckligt i effekt.”
(270 mg Concerta om dagen, beroendemottagning)

”Ritalin...Effekten varit otillräcklig, dessutom besvärande biverkningar.”

”prövat behandling med Ritalin men ej tolererat denna, blivit mer uppvarvad, aggressiv etc.”